

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百九十四

詳校官太醫院醫士

臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣楊世綸

謄錄監生臣馮曰琮

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十四 明

周王朱櫛 撰

癭瘤門

總論

夫癭瘤者多由喜怒不節憂思過度而成斯病焉大抵人之氣血循環常欲無滯留之患調攝失宜氣凝血滯為癭為瘤為癭者多結於頸項之間瘤者隨氣凝結於皮肉之內忽然腫起狀如桃李子久則滋長醫經所

謂癭有五種瘤有六證五癭者石癭肉癭筋癭血癭氣癭是也六瘤者骨瘤脂瘤血瘤石瘤膿瘤肉瘤也法治療之五癭不可決破決破則膿血崩潰多致夭枉六瘤者脂瘤可破去脂粉則愈外五瘤亦不可輕易決潰慎之

諸癭瘤

附論

夫氣血凝滯結為癭瘤癭則憂患所生着於眉項皮寬不急槌槌而垂是也瘤則隨氣瘤住初作桃李之狀皮

嫩而光漸如盃卵是也其肉色不變者謂之肉癭其筋
脉呈露者謂之筋癭其赤脉交絡者謂之血癭隨憂患
而消長者謂之氣癭堅硬而不可移者謂之石癭癭之
名有五者此也一曰骨瘤二曰脂瘤三曰肉瘤四曰膿
瘤五曰血瘤六曰石瘤瘤之名有六者此也癭瘤一者
雖無痛癢最不可決破決破則膿血崩潰滲漏無已必
至殺人其間肉瘤攻療尤所不許若夫脂瘤氣癭隨順
用藥尚庶幾焉

海藻丸

海蛤

煨

松蘿

各七錢半

當歸

川芎

官桂

白芷

細辛

藿香

白飲

明礬

煨

昆布

洗晒

海藻

洗晒一兩

右為細末煉蜜丸彈子大每一丸含咽下

穿癭丸

治癭瘤結硬

通草

二兩

杏仁

去皮尖研

牛蒡

各一合出油

五射干

昆布

去鹹

呵黎勒

海藻

去鹹各四兩

右為末煉蜜為丸如彈子大噉化嚥津下日進三服

海藻散

治癭瘤

海藻

洗去鹹焙各一兩二分

昆布

洗去鹹焙一兩半

白茯苓

去黑皮半兩

海蛤

研

木通

剉

桂

去粗皮半兩

羊靨

十枚去脂炙令黃

右為散非時溫酒下三錢匕夜一服

治癭瘤方

昆布

洗去鹹焙

桂心

逆流水根柳髮

各一兩

海藻

洗去鹹焙

乾薑

各二兩炮製

羊靨

七枚陰乾

右為末蜜丸小彈子大含一丸咽津無時忌五辛濕

麪熟物

海蛤散 治癭瘤

海蛤

研

海藻

馬苦者洗去鹹焙

白茯苓

去黑皮

人參

半夏

火煮一兩洗去滑切焙各半兩

右為散每服一錢匕入豬膽子末錢匕甜藤一尺去根五寸取之甘草一寸水五盞同煎取一盞半分三次每次調散二盞七臨卧服男人四服女人八服次用丸藥宣下

除毒丸

治癰瘤服海蛤散後宜服此

巴豆

鐵串穿燈上
燒了去心

大黃末

各半
兩

右為末午日粽子丸如棗豆大空心冷茶下三九良久熱茶投之下多以冷粥止之

連殼丸

治氣瘤成癰

連殼

微炒
二兩

石榴皮

醋
焙

乾薑

炮各
三分

枳殼

麩炒去
穢一兩

右為末更入百草霜一兩射香少許各細研打醋麪糊為丸如小豆大每日空心用胡椒米飲湯下三十

丸至五十九

瘰癧散 治氣癭瘤

瘰癧

二七枚
久人

半夏

洗去滑二
十二枚

右為散每服溫酒調一錢匕臨卧垂頭服

海藻酒方

治頸下卒結核漸大欲成瘤癭

用海藻法去鹹一觔酒二升漬一宿取三合飲之酒盡將海藻爆乾搗末酒調一錢匕日三即差如浸用絹袋盛了漬春夏二日秋冬三日

柳根酒 治癭瘤

用柳根三觔須水所經露出者水一斗煮取五升用
米三升釀之酒成每服飲半升空心日午臨卧各一
服

治癭瘤鬼氣症

用鉛錫為末和香油傳之

癭 附論

夫癭者由憂患氣結所生亦由飲沙水沙隨氣入於脉

搏頸下而成之初作與癭核相似而當頸下也皮寬不
急垂槌槌然是也患氣結成癭者但垂核槌槌然無脉
也飲沙水成癭者有核癰癰然無根浮動在皮中又云
有三種癭有血癭可破也息肉癭可割之有氣癭可具
針之養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常
食令人作癭病動氣增患癭病者始作與癭核相似其
癭病喜當頸下當中央不偏兩邊也乃不急槌然則是
癭也中國人息氣結癭者但垂槌槌無核也長安及襄

陽蠻人其飲沙水喜癭有核瘰癧耳無根浮動在皮中
其地婦人患之腎氣實沙石性合於腎則令腎實故病
癭也地方婦人飲沙水者其產乳甚難非針不出是
以比家有不救者良由此也凡癭袋脹悶養生論云兩
山夾水其人多癭瘡土厚水深其人多癭地勢使然
也此可服人參化癭丹自消癭藥多用海藻海帶味
屬鹹寒儒門事親書云新寨一婦人年四十餘有癭
三年戴人以鹹令吐三涌三汗三下癭也半消次服

化癭之藥遂大消去夫病在上者皆宜吐亦自有消息之法耳

治癭

名化癭丹

海藻 海帶 昆布 澤瀉 木通 礞石 羊

蠣

各三枚

海蛤 連翹

右為細末研礞為丸如鷄頭子大每服一丸臨卧噙化一方無木通

療癭

昆布

洗 六分

海藻

洗 七分

松蘿

乾薑

桂心

各四分

通草

五分

右搗篩蜜為丸如梧桐子大每服吞七丸即住在頸下癭處欲至食時即先飲少酒下却丸子然後食禁酢蒜鹽酪臭肉倉米若癭大者加藥令取差

又方 療頸下卒結囊欲成癭

昆布

洗

海藻

洗各一筋

右細切好酒五升浸七日量力取數服酒更浸兩遍

藥力盡當以此酒下藥彌良一方為末蜜合丸如杏核大含稍咽汁日四五度佳

木通散 治頸下卒生結囊欲成癰

木通

剉

海藻

昆布

各洗去鹹味

松蘿

桂心

蛤蚧

塗酥炙令微黃

白欬

琥珀

各一兩

右為末散每服不時計候以溫酒調下二錢

海藻散 療癰

海藻

八兩去鹹味

貝母

二兩

土瓜根

二分

小麥麴

二兩炙

分

右作散酒服方寸匕日三

昆布丸 治一切癭病不問久新

昆布

洗一兩

海藻

洗一兩

小麥

好醋煮乾一兩

右為細末煉蜜為丸如杏核大每服一丸食前噉嚥

治癭項

蒲黃

三兩如無用寒食代之

獐廩

羊廩

各五兩去脂臄焙乾

右為細末用錫糖為丸如彈子大噉化

療癭方

昆布

洗

松蘿

各三分

海藻

洗五分

右搗蜜丸如杏核大含咽津日三夜二佳

治忽生癭病一二年者

用萬州黃藥子三觔須緊重者為上如輕虛即是他州者力薄須用一倍取無灰酒一斗投藥其中固濟瓶口以糠火燒一服時停剩待酒冷即令患者時時飲一盞不令絕酒氣經三五日後常把鏡自照覺銷即停飲不爾令人頸細也糠火不可多堆燒使酒

氣香出瓶頭有津即止火不可待經宿也已驗如神
忌毒食

療癭方

用淳苦酒一升漬小麥一升含溫瀝出曝燥後不須
使苦酒浸曝麥燥搗篩以海藻五兩別搗以和麥末
令調酒服方寸七日三禁鹽生魚生菜生肉

又方

用秫米三升依酒法飲取圓葉白楊皮十兩去土蒼

者損勿令見風細切五升煮取二升濃汁漬麴末五兩用前件秫末依酒法釀之熟訖封塞一七日後空心腹服一大盞日再服三日即效

又方

用小麥三升三年米醋三升漬麥暴乾更浸使醋盡又暴乾搗篩為散別搗昆布為散每服取麥散二匕昆布散一匕但飽食訖清酒和服之若不能飲酒者以水和服亦得服盡即瘥多服彌善無所禁但不用

舉重及悲啼煩惱等事

救急療癰方

用鼠粘草根大一升湯洗細切除皮者一升以水三升煮取一升半分溫三服服相去如人行四五里一服宜頓服六劑病即差又一方削皮細切取三大升搗篩為散蜜和丸如梧桐子大一服一十九日再服之稍稍加至三十九丸以無灰酒進之

治癰

以杜蘅食之

五癭 附論

石癭泥癭勞癭憂癭氣癭是為五癭石與泥則因山水飲食而得之憂勞氣則本於情情之所感氣則隨之或上而不下或結而不散是也破結散下治五癭堅硬不可移名石癭皮色不硬名肉癭筋絡露結名筋癭赤脉交絡名血癭隨憂愁消長名氣癭五癭皆不可妄決破則膿血崩潰多致夭枉服此

五癭丸

菖蒲

二兩

海蛤

白飲

續斷

海藻

松蘿

官

桂心

蜀椒

倒掛草

半夏

各二兩

神麴

三兩

羊脂

百枚

右治下節以牛羊髓脂為丸如梧桐大日服三丸一方以醬浸牛羊髓脂為丸

破結散

一名破結散

治五癭等證

海藻

洗

龍膽草

海蛤

通草

昆布

洗

海帶

各三分

礬石

枯

松蘿

各三

麥麴

四

半夏

三分

右為末每服方寸匕酒調日三服忌鴆雞魚豆辛生
蒙及諸毒物十日知二十日愈一方有貝母無海帶

海藻散

治五癭

海藻

洗去
鹹焙

海蛤

各三

昆布

洗去
鹹

半夏

湯洗七遍
去滑

北

細辛

土瓜根

松蘿

各一

木通

剉

白欬

龍膽

各二
兩

右為細末每服一錢匕酒調服日再不得作勞用力

昆布散 治五癭

昆布

洗去鹹焙三兩

白飲

木通

剉海蛤

研

松蘿

各二兩

桂

去粗皮

海藻

洗去鹹焙各三兩

右為細末每服溫酒調下二錢七日二服不拘時候
禁生冷醋滑鷄豬肉魚蒜

玉壺散 治三種癭

海藻

海帶

昆布

雷丸

各一兩

青鹽

廣茂

各五錢

錢

右為細末陳米飲為丸如榛子大每服一九含化嚥
津不拘時候常令藥力不斷煉蜜和丸亦可一方無
青鹽廣茂

又方

小麥麴

斗一

海藻

升一

時生礬石

兩十

右以三年米醋浸小麥麴曝乾各搗為散合和服一
方可日四五服含極乃嚥之禁薑五辛獐魚生菜忌
吹及讀誦耳語等

又方

取鹿麋以佳酒浸令没汁炙乾內酒中更炙令香含
嚙汁味盡更易盡十具愈

治五癭

右以昆布一兩並切如脂大酢漬含嚙汁愈

氣癭

附論

夫癭之初結者由人憂志氣逆蘊蓄之所成也又飲
沙石流水毒氣不散之所致也皆是肺脾壅滯胃膈

否澀不得宣通邪氣搏咽頸故令漸漸結聚成癭宜早療之便當消散也

白前湯 治氣癭初作

白前 昆布

洗去鹹炙乾

厚朴

去粗皮生薑汁炙

杏仁

湯浸去皮尖雙

仁炒

陳橘皮

湯浸去白切乾

附子

炮製去皮漆

海藻

洗去鹹炙乾

半夏

湯洗七遍

甘草

炙剉各一兩

小麥

醋浸一宿暴乾三合

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至八分去滓食後溫服日三

杏仁丸

治氣結頸項蓄聚不散成癭

杏仁

去皮尖雙仁炒令黃

連殼

各一兩

海藻

洗去鹹焙一兩一分

訶黎勒

煨去核二兩半

昆布

洗去鹹焙

木香

各二兩

蔓荊實

搗去皮

羊靨

炙各

一兩 檳榔

剉

陳橘皮

去白焙各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲

下仍常含化一丸

因氣成癭

海藻

海帶

昆布

木通

甘草

各一兩

訶子

薄荷

各半
兩

杏仁

雙仁
浸煎

右為細末煉蜜為丸如鷄頭大噙化忌油膩鹹物

必效主氣癰方一名白頭翁丸兼治氣癰

白頭翁

半兩

昆布

十斤
洗

海藻

七斤
洗

通草

七斤

玄參

連

殼子

各八
分

桂心

三分

白飲

六分

右搗篩蜜丸如梧桐子大每服五丸用酒服藥忌蒜

麴殭魚生葱

治氣結喉中蓄聚不散成癰

白茯苓

去黑皮
三兩

半夏

湯洗
去滑

生薑

切焙各
二兩

昆布

洗去
鹹焙

海藻

洗去鹹
各五兩

桂

去粗
皮

陳橘皮

去白焙
各一兩

右為末煉蜜丸如杏仁大含化一粒細細嚥津令藥不絕

紫蘇膏

治咽喉氣噎塞成氣癭

紫蘇子

炒

桂

刮去
粗皮

大黃

剉
炒

當歸

切
焙

乾薑

炮各
半兩

陳橘

皮

湯浸去白
焙一兩

蜀椒

去目并開口者
炒出汗一分

猪脂

臘月者煎
去滓半勛

右㕮咀如麻豆大先以水六升煎至二升綿濾過去

淳肉猪脂再煎成膏取塗癭上日二夜一以差為度忌生葱

治氣癭

問荊

一兩出
海島

羯羊鰾

五具去
明炙

白欬

椒目

甘草

炙各
一分

小麥麴米

二兩
熬

右為散羊鰾一種別搗為末相和如好將水浸更搗作丸如小棗大一服五丸無禁

昆布丸 治癭氣初結喉中壅悶不治即漸腫大宜服

昆布

洗去鹹味

訶黎勒皮

一兩

檳榔

一兩

松蘿

半兩

乾薑

半兩

桂心

半兩

海藻

一兩

木通

二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食前後以溫酒

下二十丸

又方

昆布

一兩洗去鹹味

海藻

一兩洗去鹹味

訶黎勒皮

一兩

枳殼

半兩炒

去穢

右為末煉蜜和丸如杏核大常以含一丸嚥津

又方

琥珀

一兩

大黃

一兩

微炒

剉

昆布

半兩

去鹹味

洗

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日空心及晚食後
溫酒下二十丸又名琥珀丸

又方

檳榔

三兩

海藻

二兩

洗

去鹹味

昆布

三兩

去鹹味

洗

右為末煉蜜和丸如小彈子大每日常含一丸徐徐
嚥津一名檳榔丸忌鹽

治氣癭

海藻 海帶 海螵蛸

右等分為細末酒煮空心服

治氣癭

用海藻為末露一宿侵晨不須洗面旋汲井花水調面東禮拜面東服每日如此服之至半月如已消滅不可再服則差細矣

針砂方 專治氣癭

用針砂浸於水缸平日飲食皆用此水十日一換針砂服之半年自然消散針砂不能漬也

治氣癭

用羊廩一具去脂生含汁盡去

療氣癭方

用平旦手挽癭令難指其下眼脉斷愈一日一度指易愈者七日難愈者三七日

蟾蜍散 治項氣又名癭氣

白礬

一兩生
令細

全蝎

半兩

右將礬為末用耳鍋一箇將用麻黃包了線扎定將礬分作兩處一半在底一半在上全蝎在中心用瓦片子蓋定再用鹽泥固濟候乾用熱火二觔煨一伏取出為細末每服一錢入麝香少許將獾猪脰一箇切入藥在內用濕紙包五七重火煨熟取出臨卧細嚼只將津液送下

海帶丸

治癭氣久而不消

海帶 南貝母 青皮 陳皮

右各等分為細末煉蜜和丸如彈子大食後嚙化一
丸

海藻潰堅丸

治瘰癧氣盛大久而不散

海藻

海帶

昆布

各一兩

青鹽

半兩

廣茂

半兩

右為細末煉蜜為丸如指尖大每服一丸嚙化食服
治一切瘰癧已結成欲結已潰欲未潰

右用皂角刺四兩牽牛子四兩洗淨掃潤磚石上鋪

定皂角刺搽牽牛子在上拍火燒之成火速以盆碗
合之候冷勿使成灰為末每服一錢半或二錢飯飲
調下

癭病咽喉噎塞

附論

夫癭病咽喉噎塞者由憂患之氣在於胃膈不能消
散搏於肺脾之故咽門者胃氣之道路喉嚨者肺氣
之往來今二經為邪氣所乘致經絡否澀氣不宣通
結聚成癭在於咽喉下抑鬱滯留則為之出納者噎

塞而不通病癰者是以為急也

半夏散 治癰氣咽喉腫塞心胃煩悶

半夏

湯洗七遍去滑

射干

牛蒡子

微炒各一兩

杏仁

湯浸去皮尖雙

人麩炒微黃

羚羊角屑

木通

桔梗

去蘆頭

昆布

檳

榔

赤茯苓

各三分

枳殼

半兩麩炒微黃去穢

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生姜半分煎至六

分去滓不計時候溫服

桂心散 治癰氣咽喉腫塞

桂皮去相

昆布

海藻

洗去鹹味

甘草

炙

白麴

炙一兩

龍膽

剉

海蛤

洗去鹹味

土瓜根

半夏

為末生薑汁和作餅子暴乾

吳茱

萸

洗湯去涎焙炒

牡蠣

燒各一兩半

右為散每服二錢七酸漿水調下食後臨卧

治瘰氣咽喉腫塞防悶宜服此方

木通

剉一兩

昆布

一兩洗去鹹味

乾薑

一分剉

射干

三分

甜葶

蘆

一兩隔紙炒令紫色

羚羊角屑

三分

人參

半兩去蘆頭

海藻

半兩洗去

鹹

檳榔

三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫酒下
二十丸

治癭氣咽喉胃中滿悶腫塞

昆布

三兩

大黃

一兩

木通

一兩

判

海藻

一兩

射干

一兩

枳殼

半兩

杏仁

二兩

牛蒡子

二兩

海蛤

一兩

判

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥
飲湯下二十丸

昆布散 治癭氣結腫胃膈不利宜服

昆布

洗去鹹味

海藻

洗去鹹味

松蘿

細辛

半夏

洗七遍去滑

海蛤

細研

甘草

炙微赤剉

白欬

各一兩

龍膽

去蘆二兩

土瓜根

櫛榔

各一兩

療癭結氣方

右為散每於食後以溫酒調下二錢不得用力勞動

昆布

十二分洗

馬尾海藻

十分洗

杏仁

去皮尖八分

通草

麥

門冬

去心六分

連翹

六分

乾薑

陳橘皮

各六分

茯苓

八分

松蘿

三兩

右蜜丸含之齒微微嚼藥袋子汁出入咽中日夜勿停看有問荊加四分自忌嗔及勞油膩粘食

二鱉散

一名實金散

治癰氣

獐羊鱉

各十枚煖水洗去脂膜切焙

海藻

洗去鹹炙乾

海帶

各一兩

丁

香木香

琥珀

麝香

研各一兩

真珠

半斤研

右為散每服一錢匕熱酒一盞調下垂頭卧少時若是去室男女不十服見效男子婦人患者百日見效婦人有孕不可服

治癭腫結漸大宜服此方

海藻

洗去鹹味

海帶

海蛤

細研

昆布

木香

以上各一兩

金

箔

五十片細研

猪廐

七枚炙乾

羊廐

七枚炙乾

右為散每夜臨卧時以溫酒調下二錢仍不得着枕卧如是食癭即難治

訶黎勒丸

治年深癭氣噎塞

訶黎

炒去枝

檳榔

海藻

洗去鹹焙各一兩

乾薑

炮

白茯苓

去黑皮

龍膽

桂

去粗皮各三分

昆布

洗去鹹焙一兩

右為末煉蜜和丸如酸棗大每服一丸含化不拘時

海藻丸 治咽喉中噎悶成癭

海藻

洗去鹹炙乾

檳榔

剉

昆布

洗去鹹炙乾

訶黎勒皮 文

蛤

研各三兩

海蛤

研

半夏

湯洗七遍

生薑

切焙各十一兩

小麥

米醋浸三

宿爆乾三合

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸含化日三

通氣丸 治癭氣咽喉腫塞毒氣壅悶不通

木通

剉

射干

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒

訶黎勒

煨去核

海藻

洗去
鹹焙

黃耆

各一兩

白茯苓

去黑皮
三分

惡實

微炒

昆布

洗去
鹹味

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸含化日晚再服

治癭氣胃膈壅塞咽喉漸麓宜服此方

商陸

二兩

昆布

二兩

洗去鹹味

射干

一兩

木通

一兩

判海藻

一兩

去鹹

羚羊屑

一兩

杏仁

一兩

湯浸去皮尖

雙仁麤炒微黃

牛蒡子

一兩

微炒

半

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去

滓不計時候溫服

羊靨丸

治咽喉不利項頸漸麤將成癭病

羊靨

二十七枚
炙黃切

人參

一兩半

木通

剉一兩

海蛤

研

昆布

去鹹

炙乾

三兩

右為末蜜煉和丸如梧桐子大每服十五丸至二十

丸米飲湯下再服

昆布丸

治咽喉塞冷氣上築搏防悶漸成癭氣

昆布

去鹹炙乾

杏仁

去皮尖雙仁炒研

犀角

人參

二兩半

吳茱

萸

洗焙乾炒

海藻

去鹹炙乾各二兩

乾姜

炮

葶藶子

紙上炒各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲湯

下日三

連翹丸 治癭病咽喉噎氣塞

連翹

木通

剉

乾姜

炮

各一兩

羊脂

炙

七枚

昆布

去

鹹

焙

各一兩

杏仁

去

皮

尖

雙

人

一十七枚

車前子

微

炒

一兩

半夏

為

末

生

薑

汁

和

作餅子暴

乾一
兩

右為散每服二錢匕米飲調下日二服食後臨卧

治癭氣咽喉腫塞宜服此方

松蘿

一兩

昆布

二兩

洗去鹹味

海藻

二兩

洗去鹹味

羚羊角屑

一兩

木

通

一兩

判

柳根鬚

一兩

檳榔

一兩

兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時二十九

粥飲下

茯苓湯

白茯苓

去黑

人參

各一

海藻

洗去

鹹味

海蛤

甘草

炙

到

蒼朮子

各一

半夏

為末

生薑汁和作

餅子曝乾

一兩

右為麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫

服

治癭氣咽喉腫塞妨悶

半夏

湯洗七遍去滑

海藻

洗去鹹味

龍膽

去淨頭

昆布

洗去鹹味

土瓜

根

射干

小麥麴

各三分

右為散每服不計時候生姜酒調下一錢

治癭氣神驗方

琥珀

半兩

昆布

一兩洗去鹹

小麥

三分酒煮

烏賊魚骨

二兩

桔梗

半兩去蘆

右為末煉蜜丸如小彈子大綿裹一丸常含嚥津

治瘰氣結腫心胃不利煩滿宜服此方

海藻

一兩 去鹹

昆布

一兩 洗 去鹹

木通

一兩 剉

連翹

一兩

麥門冬

一兩半 去心焙

杏仁

二兩 湯浸去皮火 雙仁麩炒微黃

赤苓

一兩

人參

半兩 去蘆

頭

陳橘皮

半兩 水浸 去白焙

牛蒡子

一兩

羊靨

二十枚 炙乾

右為末煉蜜和丸如小彈子大綿裹一丸含嚥津日

三四服

蛤蚧丸 治瘰氣腫塞

蛤蚧

全者 醉炙一對

真珠末

海藻

洗去鹹焙各一分

右為末棗肉為丸如桐子大每服二十九丸木通湯下

麥門冬

治癭腫悶

麥門冬

去心焙

昆布

洗去鹹焙各三分

黃耆

焙

大黃

剉一蒸

陳

橘皮

湯浸去白焙

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

甘草

炙剉各一兩

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸含化

治癭氣胃膈壅塞咽喉漸麤宜服

羊靨

一百枚去脂炙

大棗

二十枚去皮核

右同杵作丸梧桐子大每服水下七丸

治癭氣令內消方

用黃牛食系三具乾者於瓷瓶中以瓦子蓋頭鹽泥固濟候乾燒令通赤待冷取出細研為散每於食後以粥飲調下一錢

海藻酒方 治咽喉噎塞冷氣妨悶結成癭氣

用海藻洗去鹹二兩細剉以清酒四升浸兩宿漉去滓每服半盞細細含嚥日三不拘時以差為度

治癭氣結核瘡腫硬

用昆布一两洗去鹹搗為末每以一錢綿囊於醋中浸含嚥津藥末盡再含之一方蜜丸含化自消

治癭氣結硬腫大諸藥無效服之百日必得全差方

黃牛食系

五具以猛炭灰火燭為灰研為末於瓷瓶內放蜜蓋瓶口不得見風

海藻

五兩 昆布

五兩以上二味以清水漬五日脫換清水洗去鹹味暴乾

白殭蚕

五兩微炒

右為末散入牛食系末研令勻每服以溫酒調下二

錢日三服以差為度

治癭氣結腫方

昆布

洗去鹹味

馬片子

半兩

茵芋

半兩

蕪荑仁

半兩

蒟醬

半兩

右為末以醋浸蒸餅和丸如小彈子大以綿裹一丸含化嚥津日四五服以差為度

治癭氣咽喉腫塞心胃煩悶

琥珀

半兩

皂莢子仁

微炒

牛蒡子

右為散每服食前以葱白湯調下二錢

通氣丸

治咽喉氣悶胃膈滿塞項頸漸麤

木通

判

海藻

洗去鹹味炙乾

海蛤

研各一兩

昆布

洗去鹹味炙乾一兩

羊

麋

二十枚炙黃切

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸含化忌生菜

熟麴炙肉蒜笋

羚羊角丸

治癰氣胃悶壅塞咽喉漸麓宜服大效

羚羊角屑

一兩

昆布

一兩洗去鹹味

桂心

一兩

大黃

一兩判微炒

木

通

一兩判

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服不計時以粥飲

下二十九

治瘕氣經久不消神效方

海帶

一兩

海藻

昆布

各一兩洗去鹹味

右為末煮赤小豆并棗肉同研為丸如小栗子大以
綿裹每月如大盡取二十八日夜小盡取二十七日
至月終三夜臨卧時淨灌漱含卧嚥津不語至明別
日不得服

松蘿丸

治瘕氣結核癰瘤腫硬

松蘿

昆布

洗去鹹味

木通

剉

柳根鬚

逆水生者洗焙乾以上各二兩

右為末煉蜜和搗三三杵丸如小彈子大常含一丸細細嚥津令藥在喉中相接為妙

瘤

附論

瘤之為義留滯而不去也氣血流行不失其常則形體和平無或餘贅及鬱結壅塞則乘虛投隙瘤所以生初為小核浸以長大若盂孟然不痒不痛亦不繼強方劑所治與治癭法同但癭有可鍼割而瘤慎不可破決爾

儒門事親書云戴人在西華衆皆訕以為吐瀉一日魏壽之與戴人在食肆中見一夫病一瘤正當目之上納皆色如灰李下垂覆之目暗不能視物戴人謂壽之曰吾不待食熟立取此瘤魏未之信也戴人曰吾與爾取此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用力割別有術焉其人從之乃引一小室中令晚卧一床以繩束其眶刺委中人出血先令以手揉其自瘤止亦刺出雀斑立平出戶壽之大驚戴人曰人之有之技可盡觀手

部戴人之鄉有一女子未嫁年十八兩手背皆有瘤一
類鷄距一類角丸腕不能馴向明望之如桃膠然夫家
欲弃之戴人見之曰在手皆為膠瘤在面者為粉瘤此
膠瘤也以銚鍼十字刺破按出黃膠膿三兩匙立平核
更不復作婚事復成非素明不敢用此法耳外臺秘要
時後云皮肉中忽有腫起初如梅李漸長大不痒不痛
又不堅強按之揉軟此血瘤也不療至如盤大則不可
消而非殺人病耳亦慎不可破方乃有大療今如覺但

依癭家療療若不消更別有大方

陷腫散 治二三十年瘤及骨瘤肉瘤膿血瘤瘰肉

大如盂盂久不瘥致有癰潰令人骨消肉盡或潰

令人驚惕寢寤不安身體瘰縮愈而復發宜服此

方

烏賊魚骨

半兩
燒灰

硫黃

半兩
細研

白石英

分半
兩

鍾乳

分半
兩

丹參

三分

琥珀末

二兩

附子

一兩
炮製
去皮剝

乾薑

一兩
炮製

大

黃

一兩

川芒硝

二兩

右為散以囊盛勿泄氣若瘡濕即乾傳之若瘡乾以猪脂和傳之日三四以上效為度若消不盡者至五劑十劑止藥令入之不痛若不消加芒硝二兩一方有紫石英

治癭腫悶宜服此

大黃

二兩 剉 鹹炒

昆布

一兩 洗 去鹹味

海藻

二兩 洗 去鹹味

玄參

一兩 枳

殼

一兩 麩炒 微黃去穰

芎藭

一兩 杏仁

一兩 湯浸去皮尖 雙入麩炒微黃

延胡

索琥珀

一兩 一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以木通湯送下
二十九

枯瘤方

砒 礪砂 黃丹 雄黃 粉霜 輕粉

以上各一分

班猫

二十箇
生用

硃砂

一錢

乳香

沒藥

一錢

右同研為末粥糊為丸捏作碁子樣曝乾先炙破瘤
頂三炷然後以藥餅蓋上用黃蘗水末以水調貼上
數日自然乾枯下落

餅金散 治枯瘤子

砒霜

一兩

砒黃

一兩

巴豆

半兩

皮

出

油

木鱉子

一兩

研

如泥

去皮

右同為細末入石腦油和一塊用紙二十四重裏藥

磁合內盛入地二尺埋兩箇月取出陰乾後入

輕粉

一錢

雄黃

半錢

粉霜

二兩

乳香

一錢

沒藥

二錢

蟾酥

一錢

錢

錢

右同前藥研為細末先放瘤子頂上炙三炷唾調塗

之上用紙封三重每日上次先藥休去了

金黃散

作定子瘤子破了用此藥任在四邊自落薑酒下早晚各一丸如小腸氣三丸切生薑三錢炒焦酒下如傷酒二丸飛白礬生薑自然汁調下婦人心氣痛醋湯下二丸

紫蘇子膏

治項氣成瘤方

見本門氣瘰類

生肉膏

治癰瘤潰漏及金瘡百瘡方

當歸

附子

甘草

白芷

芎藭

各一兩

薤白

生地黃

右咀咬以猪脂三升半煎白芷黃去滓稍以傳之三

日

蔓荊實丸 治瘤

蔓荊實

去白皮 炒一兩

甘草

炙劉 一兩

羊脂

二十枚 去脂膜別搗

白飲

半兩

椒目

一分

小麥麴

微炒 一兩

昆布黃耆湯

一名來 門冬丸

治瘤腫

方見癭瘤咽 喉噎塞本類

右將五味為末與羊脂末相和以好醬更搗丸如梧

桐子大每服酒下五丸

消毒散 治毒氣項下結核成為瘤者

皂角子

五百枚 慢火炒烈

薄荷

乾者 二兩

檳榔

剉 半兩

甘草

炙 剉 連

翹

各一兩

右為散每服二錢匕食後臨卧米飲調下臘茶亦可
深思療瘤脂細瘤方

吳茱萸

一分 礬石

燒

芎藭

當歸

大黃

黃連

芍藥 白欬 黃芩

右合搗下篩和和鷄子塗著細故布上便瘤大小薄

厚貼之燥輒易之著藥當熟作膿貼細細從孔中出探之知膿血盡著生肉膏若膿血不盡後起故也

繫瘤子自落方

砒黃

砒霜

硼砂

各半兩

巴豆

五粒去皮心

芫青

去翅足七

枚

班貓

去頭足翅七枚

右研為末先取蜘蛛網及絲共搓為線子水濕塗藥末於上貼子中常以藥末養遇有患者以線繫之留線頭如痒即繫之如痛即不用繫其瘤自黑乾如胡

桃大者三四日自落如茄子大者半月落更大者不
過二十八日如瓜者不過一月如血瘤繫之血出者
服定血藥燕服藥治之

黃芩散 治諸瘤血出

黃芩

去黑心

黃蘗

去粗皮剉

黃連

去鬚

鬱金

各半兩

右為散入寒食麪五錢匕水調貼之

小黃膏 治瘤

黃蘗

黃芩

大黃

各等分

右為末以水調為糊比枯瘤藥大一遭塗之三日一
易至八九上不取直候可取

治小瘤方

先用甘草煎膏筆蘸粧瘤四傍乾後復粧凡三次以藥

大戟 芫花 甘遂

右等分為末米醋調別筆粧傳其中不得近著甘草
處次日縮小又以甘草膏粧小暈三次中門仍用大
戟芫花甘遂如前自然焦縮凡膏瘤肉瘤膿瘤血瘤

石瘤皆不可決惟脂瘤決去其脂粉則愈蓋六種瘤尤不可治治則殺人

信

一兩

硫黃

一兩

井泉石

二兩

玄精石

一兩

右將藥研作小塊入砂鍋內赤石脂并鹽泥固濟勿令透氣乃入於文武火內燒煙盡取出放在地上冷定取藥後入

輕粉

一錢

乳香

二錢

硼砂

二錢

沒藥

二錢

雄黃

二錢

右同研為細末用蒸餅心和為小錠子在四邊為效

治瘤贅如破者用藥一餅安破處漸漸腐化去之不破者用針挑動用藥

信

五錢研

硫黃

五錢研

白丁香

四錢

班貓

十六箇去頭足

巴豆

十六

簡去殼油

雄黃

四錢輕粉

右為細末用油餅邊和丸如彈子大捏作餅子

龍膽丸

治氣瘤

龍膽

去蘆頭炙一兩

昆布

洗去鹹炙

海藻

洗去鹹炙各二兩

馬刀

研

海蛤

研

香草

各半兩

大黃

剉炒一分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大用破日綿裹一丸朝暮含嚥之

白頭翁丸

治氣瘤

方見本門氣瘕類

二色丸

治一切腫赤皮膚毒及瘤

天南星

半夏

甘遂

大戟

各三錢

乾薑

胡椒

桂

草撥

各三錢

代赭石

一兩

大黃

生用

右取前四味以漿水一升煮水盡為度晒乾餘六味同搗為末每用一錢巴豆三枚燒得燄起盪合却候

冷每一錢藥一處研更用醋一盞煎成膏共藥同丸
如菜豆大丸分兩處丹砂為衣一用膩粉為白衣此
兩等顏色白者或捏作餅子亦可用治瘤子每服一
丸生薑湯下

神效散 治項氣瘤結附贅日漸增長

獐羊靨

各三十枚旋入鹽腸內煮過今人乾只用鹽亦得

陳皮

去白焙炒一兩

右為散每服二錢匕空心米飲下初結不過數服覺
消不用久服

治瘤

雄黃

錢一

人言

錢一

分

右研為細末稀粥糊調藥攤在瘡頂兒上用針鍼破
用貼藥紙封

治白瘤方

白礬

硫黃

等分

右為末以醋和封止

治候子

獨掃子

本名
地膚子

白礬

右等分為末煎湯洗不數次即盡去陳即中親曾用之果然

枯瘤方

用銅碌為細末刺破瘤摻在上以膏藥貼之

南星膏 治皮膚頭面生瘤不可輒有鍼灸大者如拳

小者如粟或軟或硬不疼不痛宜服

用生南星大者一枚去土薄切細研桐粘為膏滴好

醋五七滴如無生者以乾者為末投醋研為膏先將小刺病處令氣透以藥膏攤紙上像瘤大小貼覺瘡三五易瘥

繫瘤法兼去鼠妳痔

用芫花根淨洗帶濕不得犯鐵器於木石器中搗取汁用線一條浸半日或一宿以線繫定經宿即落未落再換線不過兩次自落後以龍骨并訶子末傅瘡口即合依上法繫鼠妳痔累用得效繫瘤法蘇沈良

方亦有用蜘蛛者然費力也不如此徑捷如無根只用花泡濃水浸線亦得昔趙氏嘗用以繫腰間一瘤不半日即落亦不痛

治果報面生贅瘤

用艾圓灸十壯即用醋磨雄黃塗紙上剪如葉螭奄子大貼所灸處更用膏藥重貼二日一換候痒搔出膿如菜豆粉即愈

治瘤方

用舊牛皮洗煎凍常食之瘤若破如豆腐極臭

治瘤方

用鹿草鹿二種肉剖如厚脯炙令熟榻掩一日四炙
四易痛攪出膿便愈不除更炙新肉用之良

治瘤

用人精一合半亦得青竹筒盛火上燒炮之以器蒸
取汁蜜置器中數傳瘤上良

蓖麻子方 治大人小兒項下結核漸成癭瘤

用草麻子炒黃風中吹乾每服溫湯下一枚不拘時
候日服三五枚服之五日後搗玄參為散食後溫米
飲調下一錢匕與草麻相間服三日後依前只服草
麻五日後却與玄參同服三日周而復始

繫瘤方

用稻上花蜘蛛十餘枚置桃李枝上候絲垂下取東
邊者撚為線子繫定子七日候換瘤子自落昔人病
瘤如拳大以此繫之至三換瘤子遂乾一夜忽失所

在天明於枕邊得之如一乾栗

又方

用狗屎拌雞子傳之去濃水如前方說傳生肉膏取
瘥

治肉瘤

先將麻布擦令血熱方上藥大者用藥四五次小者
用藥三四次以致根頭不痛有巨暈即止辨瘤數種
於後

軟筋瘤帶經絡垂

番花瘤形如石榴花

米瘤肉如米

粉瘤肉如粉

肉瘤色紅

茄子瘤

氣瘤肉實

骨瘤硬實

血瘤色如紫茄

軟自油瘤擦開如牛血

右十般瘤子惟有七般可醫如軟瘤番花瘤并自有破者不可療用藥之際切須審察

贅瘤方

用錦紋大黃醋磨塗瘤上漸消

白瘤方

令先極搔刮以繩縛之即愈又取東向木空中水熟

刮瘤上洗之九一日三即愈

治身上生贅肉

用海藻為末傳仍煎海藻酒服之則去

治贅瘤

用茄子咬去蒂於贅瘤上擦千百遍以茄撒於地上
茄若爛瘤平復矣

平復以點贅瘤法

凡剪去薄皮以藥點之疔落即去大者內捻出一肉

片子仍須擦令血熱方可用藥

治候子

用濃研好京黑筆抹在候子上候乾更抹以多為妙
數次即失去

又方

用買路紙不令人見揩後密藏撒於路上街磚下紙
爛則疾愈矣

又方

用青柴燒出水搽之

治流腫悶方

羊廐

一兩
乾者

青橘皮

一兩湯
去白焙

燒銀沙鍋

一兩

右為末用糯米飲和丸如梧桐子大每於食後以木通下二十九

井金散 枯瘤瘰癧大有神效

土黃

二錢

雄黃

二錢

礪砂

二錢
研

粉霜

一錢

輕粉

一錢

乳香

半錢

沒藥

半錢

右為細末假令瘤子如胡桃許用藥末少許半用津唾調稀糊得所攤去瘤子頂上如小不許唾津濕紙花兩重蓋之後用黃龍膏蓋之間且度上藥次添藥徹的周回大菲葉如比之上無徒漸瘤斬之後根銀自然有動隨後然下來一方入麝香少許

黃龍膏

用黃蘗一味為細末唾調攤去紙上

生肌青龍散

訶子皮 高茶 龍骨

右等分為細末乾摻上

做土法

砒黃

另為末
三兩

木鱉子

用半兩
去殼

巴豆

半兩不
去油

礪砂

另為末
二兩

右砒黃一處為末後用木鱉子同石腦油和成一塊

油紙裹定理於坑內四十九日取出收於磁器盛劈

作小塊

枯瘤子藥方

桑柴灰

二
梔

膩白石灰

三
梔

朽木

三
兩

乾桑耳

三
兩

草烏頭

半
觔川烏頭

四
兩

右朽木等四味燒灰作性同煎桑柴灰勻用水一桶
淋汁如法殼火成膏用之

治頭面生瘤子

用蛛絲勒瘤子根三二日自然退落

治宿肉贅瘤

右以蛭蝻燒為末和臘月猪脂傅之

治癭根瘤贅瘰肉

右用博落迪和百丈青鷄桑灰為末傅之


治繫指并贅瘤方

右以花蜘蛛網絲於黃丹中養之繫指與瘤夜至旦
自下

釘棺木斧聲

去人身上贅肉可候有候時專聽其聲聲發之時便

下手速捻二七遍已後自得消平也產婦勿用



普濟方卷二百九十四

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百九十五
六

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣楊世綸

謄錄監生臣王增聞

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十五 明 周王朱橚 撰

痔漏門

諸痔

附論

夫內經謂因而飽食筋脉橫解腸澀為痔夫痔病之候亦多矣此獨舉飽食一端者蓋飲食人之大欲存焉推此則它可觸類而知也五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四曰腸痔五曰血痔肛邊發露肉珠狀如鼠乳

時時滴清膿血曰牡痔肛邊生瘡腫痛突出一枚類口
膿潰即散曰牝痔腸口顆顆發癰且痛且痒水血淋瀝
曰脉痔腸內結核有血寒熱往來登溷脫肛曰腸痔若
血痔則每遇大便清血隨下而不止若酒痔每遇飲酒
發動瘡腫而血流若氣痔則憂恐鬱怒適臨乎前立見
腫痛大便難強力則肛出而不收治法大抵以解熱調
血順氣先之蓋熱則血傷血傷則經滯經滯則氣不能
行氣與血俱滯乘而墜入大腸此其所以為痔也諸痔

出血肛門間別有小竅下如血線不與便物共道痔久
不愈必至穿穴瘡口不合漏無已時此則變而為漏矣
蓋腸風臟毒之與痔漏同出而異名也歲積月累淫蝕
腸頭濕爛可畏此蟲為之害也其間執劑又當為治蟲
也又有腸風痔脉痔雌雄痔皆五痔之別名也其狀初
生悉在肛邊或如鼠乳結小核痒痛注悶甚者身熱惡
寒諸方論之皆因房酒過度久嗜甘肥不慎醉飽以合
陰陽擾血脉腸癖滲漏衝注下部肛邊生瘡變為痔疾

治法如覺痔作便服通氣丸槐角丸熱食者服諸利湯
踈利藏腑及浴洗熏熨以取內消切忌酒麵辛熱房室
肥膩稍存縱嗜欲腐潰膿血或逗流淫汁歲月已深穿
穴成漏即須用寸金錠子三五次痊也其次服餌調節
謹慎合宜未有不差者矣

方

治崩中及痔方

出千金方

蝟皮 人參 茯苓 白芷 禹餘糧 乾地黄

槐耳

續斷

各三兩

蒲黃

黃耆

當歸

艾葉

橘皮

白欬

甘草

各二兩

白馬蹄

酒浸一次
炙令黃

牛角

腮

各四兩

鰻鱧魚頭

二十枝

猪蹄懸甲

二十一枝
炙

右為末蜜丸梧子大酒服二十九日再稍加

鹿茸丸

聖濟
總錄

治諸痔漏牡痔脉痔腸痔血痔等

鹿茸

酒浸炙
令黃

附子

炮裂去
皮臍

龍骨

碎
研

黃耆

炙
剉

桔梗

炒

生乾地黄

牛膝

去苗酒
浸焙

芍藥

人參

白茯苓

去黑皮各
一兩一分

枳殼

去瓤
麩炒

當歸

切
焙

蛻皮

炙
焦

芎藭

槐子

微炒

白礬

煅火令升盡

桂

去皮三分

黃連

去鬚各一兩半

蒲黃

炒一兩

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸空心煎柏葉湯下日晚再服

神效散 治洗痔凡富貴之人多嗜慾酒色過度喜怒不常致生痔漏或如鼠乳連珠或糞門腸頭腫流膿漏血其痛如割不可忍者但是諸種瘡痔漏及腸風漏血此藥治之

苦參 川椒 苦葫蘆 鮮蓼子 槐花 枳殼

荊芥 金銀花 小茴香 白芷 連翹 獨活

麻黃 牡蠣煨 威靈仙 椿樹皮各二兩 加老黃茄

子二箇

炒油

右咬咀每服五錢水六七碗葱白二枝煎五七服沸去渣以盆盛藥水上坐先蒸後洗却以烏龍膏貼之卧時用再以藥渣熬水如前洗之如此三五次夜則以膏藥貼之常服葛花酒蒸香連丸多有驗

槐子丸

聖濟總錄

治燥濕痔痔有雌雄皆主之方

方見本門久痔類

槐實丸

千金方

治五種痔疾方

槐實

一兩

黃耆

枳實

麤炒

貫衆

白朮

肉豆蔻仁

防風

去義

荊芥穗

樗莢

去皮炒紫色

苦參

厚朴

麝香

芎藭

皂角子黃

炒各半兩

右搗羅為末麵糊調丸如桐子大食前米飲下三十

九丸晚再服之

蛭皮丸

直指方

治諸痔出血裏急疼痛

槐花

微炒

艾葉

炒黃

枳殼

剉

地榆

當歸

川芎

黃

著 白芍藥

白礬

煨

貫衆

各半

蝟皮

一兩

頭髮

燒三錢各

存性猪後蹄垂甲

盈尺皂角

一挺

去弦核醋炙黃

右件藥搗羅為末煉蜜丸如桐子大每服五十九丸

未食前飲下

療五痔下血不止方

槐子 五色龍骨

槲葉

炙令紫色

乾薑

芎藭

當

歸 菖根

吳茱萸

各六分

白欬

附子

炮五分

黃耆

五分大黃

猪懸蹄甲

十四枚

髮灰

四分

右搗末蜜丸空腹服如桐子大二十九日二漸加至四十丸若恐多服以意減之忌生冷炙猪魚蒜

黃耆丸 療痔

黃耆 青箱子 漏蘆 鰲甲炙 狼牙各五分 黃蘗

分四猪懸蹄甲七枚 蝟皮四分 白礬十分 燒去 羌青足

翅斑蝥去足 蜈蚣各十條 犀角屑八分

右為末蜜丸梧子大空腹以飲服二丸日二增之以知為度忌一切油膩葷菜

治五痔衆醫者所不能愈者

秦艽 白芷 厚朴 紫參 乳髮 紫苑

各一兩

雷丸 藁本

各二兩

石南

廔蟲

各半兩

貫衆

三兩 蟲蟲

半 兩猪後懸蹄

十四枚

右為末以羊髓脂煎和丸桐子大每服空腹米飲下
十五丸日二服若劇者夜一服四日後覺肛邊痒則
止八日後膿血出鼠乳悉瘥滿六十日則終身不復
發能久服益喜忌魚猪肉等物

收痔丸

方直指

諸痔通用

阿膠

炒

黃連

酥

貫衆

各半

盈尺皂角

去核

蝟皮

炙

蜂房

炒

蛇皮

畧

皂角刺

畧

穿山甲

插入

猪後

焦

蹄甲

燒

當歸

性

川芎

槐花

並用

錢半

右為末米醋糊丸桐子大每服七十九丸調氣用枳殼

散下消血熱荊芥煎湯下食前服

立聖丸

聖濟總錄

治五痔及腸風下血

槐花

枳殼

去

五倍子

去灰

黃蓍

蜜炙

切

槐莢

各二兩

猪蹄垂甲

二十枚以上並各炒焦除令淨

木賊

二兩半

何首烏

米泔浸軟以竹刀切作片子焙乾於石臼內搗末秤和入諸藥

臭橘一百枚

刺蝟皮

皂莢針

四兩

槁藤子

二枚炒上四味各用藏瓶一枚成用鹽泥

固濟各屈一穴出烟以灰火燒守候逐件烟盡退火各放冷取出研細

皂子

各三兩

右為末蜜丸桐子大每服五十丸至百丸溫酒空心

服

烏蛇散

聖濟總錄

治諸痔大腸下血

烏蛇

去皮肉骨酒浸炙

蝟皮

酒浸炙各五錢

槐子

炒

天麻

黃耆

桑皮

酒炙

枳殼

桂皮

附子

炮裂去皮臍

當歸

焙

赤芍藥

炙各三兩

白礬

燒半兩

麝香

研二錢

右為散空心陳米飲調下二錢七日晚再服溫酒亦

得

蛭皮丸

聖惠方

治五痔下血疼痛裡急不可忍

蛭皮

一兩炙令焦黃

槐子仁

二兩微炒

龍骨

二兩

槲葉

一兩微炒

乾薑

半兩炮裂剉

熟地黃

乾一兩

當歸

一兩微炒

茜根

附子

用裂一

兩去皮臍

芫薺

半兩

枳榔

一兩

黃耆

一兩

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾

為末

右為末蜜丸如桐子大每食前以粥飲下三十丸至

四十丸日三

治痔腫硬發歇疼痛久不瘥宜服此方

聖惠方

雷丸

一兩

紫參

半兩

當歸

一兩

白芷

半兩

槐子仁

一兩

亂髮

一兩

燒灰

貫衆

三兩

黃耆

一兩

麝蟲

一分

石南

一分

蟲

一分

蟲

一分

一分

去翅足

藁本

一兩

猪後懸蹄甲

七枚

炙

令黃焦

令黃焦

右為末蜜丸如桐子大每服食前以粥飲下三十丸

釣腸丸

危氏方

治久新諸痔肛邊腫硬或生瘡痒時有膿

血又治腸風下血及肛門脫出並宜服之亦治男子

婦人下血

枯蘂

二枚燒存性

蛻皮

二箇碎劉燼存性

雞冠花

劉燼炒

白

礬

微枯

綠礬

生用

白附子

生用

天南星

生用

枳殼

去麤炒

去皮臍生用

訶子

煨去皮各二兩

半夏

二兩

胡桃

取仁十五兩燒存性不油者入

確內

右為末以醋糊丸桐子大每服二十丸空心臨卧溫

酒下遠年不瘥者服十日見效久服永除根本并除
腸風等疾一方用鷄肉無胡桃

槐子丸

出聖惠方

治五痔下血痛不止

槐實

龍骨

去土研

槲葉

乾薑

炮

當歸

剉炒

茜根

黃耆

剉炒

吳茱萸

湯洗焙乾

各一兩半

炒

附子

炮裂去皮臍

一兩一分

大

黃

蒸三度炒二兩半

猪懸蹄

十四枚炙

右為末蜜丸如桐子大每服空心米飲下二十九日

二服

治五痔下血不止衆治無效宜服此方

出聖惠方

石南

一兩半

槐實

一兩半 微炒

黃耆

一兩半

貫衆

一兩 微炒

附子

一兩炮裂去皮臍

蛻皮

一枚 燒灰

黃礬

一兩 燒灰

烏蛇

三兩酒浸去皮骨酥塗炙

黃

白礬

一兩 燒灰

髮灰

一兩

露蜂房

一兩 炙 微黃

枳殼

一兩 麩炒

右為末蜜丸桐子大每空腹及晚食前桑枝湯下三

十丸

如聖散

出聖濟總錄

治諸痔

白蛻皮

二枚 燒

雞冠花

炒

皂莢針

二兩 炙各

栝蒌

一枚 燒

胡桃十枚 槐花二兩 檗莢二兩 黃耆炙 枳殼麩炒

兩 白礬 綠礬 各二兩 半水飛

右為散每服二錢匕酒和下或作丸服

如聖丸出聖濟錄 治五種痔疾

枳殼去穰 威靈仙去土 陳橘皮紅各一兩 續斷炒 白礬飛

當歸炒 乾薑炮 附子炮去 生地焙用熟 連翹炒 槐

莢子各半兩 炒香為度取莢內子

右為末蜜丸桐子大每服十丸陳粟米飲下空心食

前日二服如年深者加丸數疼痛甚者當日見效

黑神散

出王氏
傳濟方

治腸風痔疾

羌活

去蘆
頭

黃耆

黃荊實

蔓荊實

狗脊

火燎
去毛

枳殼

去穰
麩炒

檳榔

栝蒌

以盛盡藥為度不
拘枚數去子留穰

右味除栝蒌外等分為末入栝蒌中盛於沙合或瓦

罐子內鹽泥固濟煨通赤候冷取出藥末更別用藥

如後

荊芥子

白蕪荑

二味與
前等分

木香

比前
減半

右為散每服一錢匕空心茶酒調下日三

蛭皮散

出聖濟總錄

治五痔

蛭皮

炙

鱉甲

醋炙

當歸

大黃

蒸三度

炒

露蜂房

炙

蛇皮

炙

藁本

去苗土

桂

去粗皮各一兩一分

猪後懸蹄

十四枚炙

右件藥搗羅為散每於空腹煮白粥飲調下三錢匕

服日二服

治五痔及脫肛

出千金方

槐白皮

三兩

猪脂

半斤

松子

桃仁

各十枚

巴豆

七枚

薰草

一名 辛夷

甘草

白芷

各半

野葛

六銖

右咬咀煎三上三下去滓以綿沾膏塞孔中日四五

過蟲死瘡止痒痛大佳一方無葛

黃耆丸

出濟生方

治五痔出血疼痛

槭藤

煨用肉半兩

川續斷

酒浸

黃耆

去蘆

貫衆

附子

炮去皮臍

黃礬

別研

蛻皮

燒灰

當歸

去蘆酒浸

阿膠

蛤粉炒

香麝

別研

一字

右為末米糊丸桐子大每服七十丸空心米飲送下

氣壯多熱之人免服

皂刺丸

出直指方

治疼痛而復痒

皂莢刺

二兩燒烟盡存性

防風

槐花

蛇床

白礬

白蒺藜

炒去刺

枳殼

薑黃

各半兩

蜂房

五倍子

各一分

分

右為末醋調草粉糊丸小豆大每服五十丸以苦楝根煎湯下仍用童子尿熱入白礬末淨洗肛門

誥後丸

出聖濟總錄

治痔

連翹

附子

炮去皮臍

桂

去皮槐莢

白礬

枯飛

杜仲

去皮炒

枳殼

去穢
炒

黃香

當歸

切
焙
藁本

右件藥等分為末蜜丸桐子大每服十丸米飲下空

心日二

藜蘆湯

出聖濟
總錄

洗痔

藜蘆

附子

莽草

蛇床

羌活

獨活

當

歸

苦參

芍藥

各一
兩

蜀椒

去目
半兩

右味搗篩每服兩撮生絹袋盛桑松柏枝各一握生

薑一塊拍破銀石器中以水三碗煎熟去滓傾入器

中乘熟薰候溫洗之

黃耆丸

出聖惠方

治五痔下血不止疼痛壅塞不通

黃耆

一兩

蛻皮

一兩

炙

當歸

一兩

桂心

三分

槐子仁

二兩

白礬

燒一兩

麝香

一分

枳殼

二兩

附子

一兩

白

炒

白

去皮臍

花蛇

一兩

酒浸

微炙

右為末蜜丸桐子大每服食前煎栢葉湯下三十丸

拔毒散

敷掃痔腫毒處

大黃

黃柏

白芨

石膏

黃芩

各五錢

白斂

黃連

梔子

各三錢

朴硝

右末用井花水調塗

宣毒散丸

苦參

荊芥

當歸

川芎

玄參

白芷

各半兩

牽牛

一兩半

烏蛇

一條

青黛

半兩

右先將牽牛巴豆肥白者去殼十粒慢火燒令色黑去巴豆不用只用牽牛同前九味為末將煨熟大蒜搗細看稀稠得所即時糊丸桐子大每服空心以鹽

酒送下一十丸

如神丸

一名烏蛇丸
出聖濟總錄

治腸風五痔

烏蛇

酒浸去
皮骨炙

大黃

濕紙
裏煨

防風

去蘆各
二兩

黃耆

秦艽

去苗一
兩半

枳殼

去穰
炒

蝟皮

炙黑
焦

陳皮

浸去
白焙

土茯苓

炒
去

角

右為末蜜丸桐子大每日空心酒下三十丸夜卧更服當日血止痛定

丁香爛飲丸 治痔

丁香 木香 廣茂 三稜 丁皮

各二分

右為末水浸蒸餅丸如桐子大每服三十丸食後白湯下

乳香丸

出和劑方

治諸痔下血肛邊生肉或結核腫疼或生

瘡痒痛或大便難肛腸脫出又治風腸下血無問新久及諸漏根在臟腑悉能治之

枳椇

炒麩

牡蠣

火煨

華澄茄

芫花青

去頭翅足

炒黃色

大黃

蒸鶴虱

炒各半兩

白丁香

乳香

研各一兩

右為末粟米糊丸梧桐子大每服十丸至十五丸如
治腸風臘茶清下諸痔煎薤白湯下諸漏煎鐵屑湯
下並前服一方無白丁香

枳殼黃耆丸

出經驗良方

治痔

枳殼

黃連

各五兩

白雞冠

黃耆

各一兩

荊芥

二兩半

右為末糊丸每服三十丸荊芥湯下

洗痔訶子散

訶子

甘草

大黃

荊芥

白芷

三賴子

藿香

防風

各等分

右藥煎湯洗

治男子婦人痔瘡

黃連

一兩

松香

二兩

黃柏

一兩

銅青

二兩

明礬

一兩

輕粉

三錢

半

右為末乾敷上先用稻草一小把鹽一兩煎湯熏洗

每一日洗二三次敷前藥

洗方

出危氏方

黃連 黃芩 荊芥 蛇床子 各一兩 側柏葉 四兩 兒

茶 鏡面草 蚶皮草 各一握

右用新汲水煎傾盆內薰候通手却洗

三香丸 出聖濟總錄 治五痔

乳香 半兩 安息香 蜜陀僧 各一分 巴豆 七粒去油 丹

砂 麝香 研 砒霜 研各半錢 蛻皮 一枚炙搗為細末

右為末用水化炊餅丸棗豆大每服一九空心冷茶

清下

黃連阿膠丸

出永類
鈴方

治諸痔解熱調血用枳殼丸散送

下或黑豆煎湯下解裏熱先用此

追風毒剉散

治諸痔蘊熱腫痛大便不通用追風剉

散加枳殼煎服

神效方

出聖
惠方

治五痔有頭疼痛可忍

生槐煎

皂角

二兩
去皮炙

麝香

鰻鱺

炙

雄黃

黃

若丁香

各二
分

木香

一分

右末以槐煎和丸分為五丸取一淨瓶可一升以掘

地埋之著一疊子於瓶上鑽疊子作孔內大瓶中灰
蓋之後內藥一丸燒之令安穩以下部著疊孔上坐
便通汗其盡一丸藥即上內痔以藥一丸內下部立
效仍不住熏忌魚熱麵等一方無木香

小槐實丸

千金方

治五痔十年者

槐子

三斤

白糖

一斤用炒

礬石

硫黃

各一斤

大黃

乾漆

龍骨

右末四味其二種石及糖並細研內銅器中一石米

下蒸之以綿絞取汁丸藥末併手丸桐子大陰乾酒服二十九日三稍增至十丸一方治久痔溫水下

槐皮膏

和濟方

治穀道痒痛痔瘡及內外諸痔腫核結硬

或發無時痛不可忍或肛邊生瘡赤爛浸潰鼠乳附核久不消散

槐皮

棟實

各五兩裂或作豆豉

甘草

刪繁用蜂房

白芷

各二兩

當歸

二兩

桃仁

五十箇

赤小豆

二合

右剉以成煎猪膏一斤微火煎白芷色黃膏成取摩

瘡上日再并導下部刪繁方無當歸治腎勞虛或酒
醉當風所損腎藏病肛門腫生瘡因酒房傷發瀉清
血肛門疼痛蜂房膏

槐角丸

御藥苑方

治腸風疾痔大便澀滯氣結不通飲食衰

少面黃肌瘦或下血不止或在便前或在便後者宜
服

槐角

一斤炒令焦熟揀淨

黃耆

枳殼

炒熟

地

乾

當歸

防

風

各四兩

木香

一兩

右末麵糊丸桐子大每服六七十丸不拘時溫米飲下

黃金散

黃栢 黃芩 白芷 藿香 零陵香 甘草

甘松

各等分

右㕮咀黑豆一勺相和水二碗煮二十沸去滓洗却要生肌藥

聖丸子

直指方

諸痔通用

槁藤子

重一兩者三
个去穰炙酥

猪牙皂角

二兩
酥炙 蛻皮

一兩炙
令焦

大皂角刺

二兩燒
各存性

沒藥

別研 槐角

各三
錢

麝香

少許

右為末酒麵稀糊丸桐子大每服三十丸枳殼散下

一方翻花脫肛磨五七九塗

七物湯

聖濟
總錄

薰痔

乾蝦蟆

一枚
剉碎

皂莢

三挺
剉

艾

一握

鱉甲

二枚
切片

雄黃

一兩
麝

香

錢一
草烏二
枚

右剉均穿地坑內看熟火一斤方塼一片中心鑽孔

子蓋坑口旋入藥一撮披衣薰

療五痔散

肘後方

主酒客勞及損傷療下部中傍孔起居

血縱橫出及肉方

赤小豆

四分炒

黃耆

三分

附子

炮

白鯁

桂心

各一兩

芍

藥

黃芩

共二兩

右為散酒服方寸日三止血

又方

肘後方

藜蘆

大黃

黃連

各半兩

棟木子

十四枚

桃仁

十四枚去

皮巴豆

四枚去心煮

蓖麻

十四枚一名狗蟬

右㕮咀以豬脂一斤煎三沸去滓傳贅肉上日三外有此膏內服紫雪丸併行療大便急去血或至一升數合面少血色足內傷風冷積年多變痔

大黃

五分甘遂

二分

黃芩

一分乾薑

附子

各四分燒

桃仁

三十

枚去皮尖

葱白

七枚

右水六升煮一升半先服半升稍安又服半升須臾血發又服半升未斷候發日再作不過三劑瘡忌豬

肉等

治一切外痔翻花鷄冠痔三十年者大如蒸餅者赤不可治興功神效

鍋底煤

朴硝

半兩

雌黃

半兩

雄黃

半兩

膽礬

三錢

白礬

四兩

半

右合研細依次乾鍋內以瓦器蓋之鍋上留分寸恐藥滾起先發頂火仍發底火庶上下火力俱透煨令青烟盡為度取出用紙攤在地上出火毒如白礬未

甚煨過單取白礬再煨以枯為度然後一處研細再入滴乳沒藥少許每用甘草湯調傳日四五次夜間兩次自然焦黑硬脫落無瘡口腸頭三日自收如日傳夜不傳亦可凡欲傳藥先用溫湯洗痔搥乾敷藥如再敷再洗再傳三日覺疼無妨直敷直乾落為度仍服釣腸丸須依局方自合方有異效

艾葉散

出聖惠方

治五痔下血不止宜服

艾葉

半兩炒微黃

黃耆

半兩

白龍骨

一兩

地榆

一兩

枳實

一兩

半炒 白芍 一兩 熟地 乾者 一兩

右搗羅為散每服三錢水一盞煎六分去滓食前溫服

治五痔及腸風瀉血等

出聖惠方

鷹頭草

半兩

甘菊花

半兩

地榆

半兩

黃耆

一兩

金蘿藤

半兩

黃

藥 槓藤子

半兩

用肉

煨

右末以軟飯和丸桐子大每服食前粥飲下三十丸

加味四君子湯

出三田方

治五痔下血面色萎黃心忪耳鳴

脚弱氣乏口淡食不知味

人參 茯苓 白朮 甘草炙 黃耆 白扁豆蒸各

等分

右末每服二錢以湯點服一方有五味子無甘草

洗痔方

海桐皮 荆芥 甘草節 苦參 葱 黑豆

右等分剉成粗粒水五升煎湯洗凡塗藥一次洗須一次

催痔散 治五痔種疾

穿山甲

七片 火燉

蜈蚣

一個 火燉

血餘

一兩 燒灰

黃鱗魚

一箇 糞缸內片時

火燉
過了腦子

麝香

各少
許

右為末用貼

痔瘡方

蛇蛻 草麻子 荊芥 油頭髮 皂角 穿山甲

各等分

右先用輕粉煎湯洗淨瘡口後用六味烟薰

治痔頭疼痛有瘡膿血不止

出千
金方

朱砂

錢二 砒半 麝二

巴豆

一粒 去油

安息香

阿魏

一分 麵裏

煨熱

右為末蒸餅丸黃豆大每日空心枳殼湯下一丸十

日取效

蜜陀僧丸

治一切痔疾面色萎黃

蜜陀僧

燒赤

白礬灰

各一兩

槐子仁

炒

雞冠花

錫墨

各半兩

皂莢灰

一分

右為末以麵糊丸梧子大每服二十丸煎栢葉湯下

空心服之

蝟皮散 治痔

蝟皮

一枚

黃牛角腮

一對

鯪鯉甲

二兩

猪牙皂角

野猪

肉

栲子葉

四兩

右用新瓶一隻盛新瓦子蓋口紙泥封乾後煨過赤放冷取出研為散入麝香少許每服二錢七服用胡桃仁一枚分作二服研細溫酒調下久患不過五七服差夜卧更深服

神妙湯

出聖濟
總錄

薰洗痔疾

草薢

括萎根

甘草

五倍子

豉

葱白

切

右等分研每服一二兩水兩碗煎數沸盆盛坐薰痔

候通洗

黃耆丸

治牝痔下血

黃耆

枳實

各二兩炙

烏蛇

炙

當歸

赤石脂

各一兩

蜆

皮

二兩炙

右末蜜丸空腹服酒下如桐子大二十丸日二服更

不加減不利忌血猪肉魚蒜臭物

蜜陀僧散

出聖惠方

治五痔下血疼痛不可忍

蜜陀僧

半兩細灰

橡實

半兩

肉苴蔻

半兩去殼

地龍

一兩微炒

槁藤

子

一兩煨蝦

檳榔

右為散每服食前以粥調下一錢

六神丸

出聖濟總錄

治五痔腫痛

鶴虱

金星石

煨酒淬三過各一兩

芫青

五十箇去足翅生用

皂莢仁

个一百

磁石

煨醋淬十遍

鉛丹

各一兩研

右為末用荷葉四五重裹放飯上蒸一饌取出研勻
別取白礬一分泡水和丸桐子大每服十丸麝香酒
臨卧時連三服未效再一二服

治外痔亦治惡瘡癰瘡

珍珠

雄黃

雌黃

各一兩

竹茹

二兩

豬膏

一斤

右為末內豬膏中和調又切亂髮半鷄子大東向煎
三上三下髮焦出其痔先用鹽湯洗拭乾後傳

寬腸丸散

治年深日近痔疾

當歸 荊芥 枳殼 香附 甘草 各等分

右為末米飲調下二錢

王龍膏

白礬

指頭大

膽礬

硫黃

各二大如豆

礪砂

五粒大如指頭大

右同入黑盞內火煨過候冷取出入乳香末黃丹各半錢朱砂三錢研勻每服少許油調塗一日三次至三四日其痔瘤皆黑色便不用只用催落藥

治痔瘡

雄黃

五分
細研

沒藥

二錢五分
明淨者

白礬

半飛
半生

五倍子

炮
過

靈脂

一錢
去石
煉退頭烟

右研全極細末用紙花子貼瘡上

五灰散

出肘
後方

治五痔不問內外牝牡寒溫勞濕悉主之

鱉甲

治牡
痔

蛻皮

治牝
痔

猪左懸蹄甲

治腸
痔

蜂房

治脉
痔

蛇蛻

治氣痔
各等分

右燒存性隨證位一分為末井水調二錢空心臨卧

一服一方有麝香無蛻皮粥飲調下一方亦以傳瘡

上五劑不差更服一名驚甲散各半兩爰用

取痔千金方

出家藏經驗方

可用甘草節同葱白煎湯用新筆

頭點藥水輕輕洗淨休破了痔頭成漏難治

砒霜

色黃明者三錢

白礬

明淨者十兩

號丹

一錢水飛過炒

蝎稍

以稍尾全

者七个洗淨瓦上焙乾

草烏豆末

一錢小而緊滑者去皮揀生用

右用熱便鉄銚炭火煨紅放冷揩拭淨先下白礬燒令

滾沸次下砒霜拌勻攪合候沸定三兩次了礬乾烟

盡為度放地上出火毒研為末方入草烏黃丹蝎稍

同研收於新瓦礮內埋地內乾處二日取出如痔痛
旋加乳香沒藥末少許入於前藥內如用先以甘草
水或葱水輕輕洗淨休破了以生芝蔴油調或蜜調
毛翎掃痔頭或用筆點藥少許於痔上坐卧以痔頭
向空處椅子開穴坐草蓆亦開穴以肛門坐空處待
黃水自然滴下十日內乾又五七日內其瘡乾痂自
落連根去了生好肉平後登廁於野處不可登後架
坑上恐舊糞觸了房室油膩鮓物等一月遠者不出

十日可取盡近者化為水連根去好肉臨安曹五醫
痔本刀鐮人因黃院子薦引為宋高宗取用此方愈
後官至觀察使一士夫內鄉亦苦此十餘年如四五
枚櫻桃大血出如箭因過金陵遇醫重請之用此藥
斷絕根經驗方云昔隆慶府安住一內子久患得此
方調治遂除其根重謝之後每調官不敢相忘必多
治饋重感其意慨然以方授之甚屬秘藏安屢製以
施人無不效者僕聞而求之不可不傳

薰洗方

出經驗良方

槐花

兩半

蓮房

一箇

五倍子

三個研細

荊芥

錢五

地榆皮

右為末每服半兩水一碗瓦器煎入朴硝白礬各三錢重先薰後洗之

五灰膏

出危氏方

治藏府一切蘊毒發痔瘡不問遠年近日

形如雞冠蓮花桃核牛乳或內或外並皆治之

蕎麥灰

半升

荊芥

老杉枝

山白竹

薊柴

右柴竹截作三尺長以斧劈破成片每取束曬乾於

火上燒過置罈內為灰防為風化候燒盡却以水於
窩內煮出灰汁又用酒漏以花帛實其竅置蕎麥灰
於酒漏內以所煮四般灰汁淋之然後取汁於窩內
慢火熬汁約取一小碗候冷入石灰醵丹同和成膏
以瓦瓶貯之上用石灰傅面不令灰氣臨用時卻出
石灰冷水調開令病者以水洗洗淨痔瘡仰卧合起
一足先濕紙於瘡四圍貼護却用竹篦挑藥塗痔上
須更痛息用紙揩去藥再塗如此三四遍要痔瘡如

黑樣黑方止以水洗淨每日常置冷水一盆以葱湯和之日洗三五遍六七日膿穢出盡其瘡自消

治痔方

槐花

半斤猪臟使五个盛線縛砂鍋煮熟取出槐花焙為末

薄荷

百藥煎

當歸

黃連各五兩為末

右麵糊丸桐子大每服五十丸至百丸空心米湯送

下

上馬散

出楊氏家藏

治五種痔疾初可以消散痛不可行坐

者

朴硝 薄荷 荊芥 枳殼 蓮房

各等分

右咬咀每服用一兩水三升煎三五十遍薰洗痔上未效再用即愈

治因痔疾阻大便秘結

出本出方

牽牛

四兩丸上炒

青皮

二兩

威靈仙

大戟

大黃

各一兩

右為末量人大小每服一二錢至三錢用蜜酒調下須用熟水漱口服

傳痔方

斑猫

十個輕粉

半錢

馬牙硝

三十枚

紅椒

一錢

黃皮

半錢

右為末先用皂角荆芥洗令淨拭乾用麻油調藥

聖五丹

出直指方

治痔

雄黃

葉子雌黃

朴硝

綠礬

明白礬

各半兩

右件各別磕碎以銀窩一入雄黃二入雌黃三入朴硝四入綠礬五入白礬圓瓦片蓋定灰火煨一日夜看青烟盡有紅烟上方好候冷取出紙襯頓地用盆

出火毒一日夜入乳香沒藥各一錢同研極細每抄
一匙煎甘草湯調外用鷄翎掃藥末蓋之日一次夜
一次自然乾硬而脫逐日須用葱白煎入朴硝溫洗
軟帛拭乾然後敷藥治痔猪膽膏猪膽七枚各取汁
以建盞坐炭火熬成膏用單紙攤傳須用鮮槐根取
白皮煎湯溫洗然後傳藥

沒藥散

出聖濟
總錄

治五痔消毒

沒藥

一兩

黃礬

白礬

溺塗

火煨各
半兩

麝香

一錢
研

右研令勻每用時先以葱湯洗拭淨以藥乾傳

乳石散

出聖濟方

治五痔花

花乳石

一兩煨研

乳香

去石研

膽礬

研

夜明砂

地龍

去土

末細

右等分研勻用時先以甘草湯洗痔淨以藥乾傳令

痔消釋

藥藥散

塗痔漏

黃藥

鉛丹

黃連

膩粉

白礬

右等分為散先煎葱湯洗後用藥散一錢以塗之久
患不過三度一方無膩粉唾津調塗

五物湯

出聖濟
總錄

薰洗諸痔

莨菪子

二兩

白礬

一兩通明者半兩生用半
兩銑器內盛慢火煨過

蓬砂

馬牙硝

各一分已上四
味一處先碾碎

朴硝

五兩同前四
味一處碾

右用百沸湯一大碗藥末五錢匕浸薰洗痔痛處食

後夜卧以衣覆護只留痔瘡

綠雲湯

出聖
濟方

治痔已用藥淋瀝了貼痔

卷柏 檮根白皮 貫衆 地骨皮 朴硝

各一兩

右搗篩每用十五錢七葱二枝水五升煮四升去滓
葉熟漂之

二黃散

出聖濟總錄

塗痔

黃蘗

一兩

黃葵花

乾生地

半兩

白芨

半兩

青黛

二塊

右五味為散先漂了用朴硝水塗之乾即易之以瘥
為度

療五痔衆醫所不能療神方

出肘後方

雷丸

半斤

蜜虫

兩

石南草

兩

藁本

兩

猪後懸蹄

十四

枝燒
令焦

右搗下以羊髓脂調和先食飲服十五丸日再劇者
夜又一那十四日痒止更八日膿血盡鼠乳悉愈滿
六十日終不發也忌魚猪肉大神效

硫黃散

出聖
惠方

治五痔疼痛久不瘥

硫黃

兩

蛇黃

一兩

金星者

白礬

一兩

鰻鱺頭

一枚

鯽魚

大者

一頭開肚去腸入四味在內以麻皮
纏之油泥包之令乾燒烟盡取出

右研如粉每服食前粥飲下二錢日三

龍涎散

龍骨 蜜陀僧 花蕊石 黃栢

各一分

右為末每用少許乾傅上生肌

洗法

出三因方

海桐皮 蛇床子

各一兩

香南藤

葱白

各三兩

右水一斗藥五兩煎減半去滓候溫著手輕洗以絹拭一法用槐白皮煎淋渫取佳

治痔瘡方

當歸

蓮花蕊

各一兩

牽牛頭末

四兩

紅土

少許

右用新瓦上焙乾為末每四錢好酒調下利三五行為度如不利來日再依前服比及服藥休喫夜飯來日早空心辰時前後先食熟肉四兩約至巳午時前後服藥大有神效卯時即止

治痔方

苦參

四兩半

血竭

四錢

椿樹皮

二兩乾者

芫荽子

約二合淨即去積

薰藥

右以咀水半碗酒半盞煎六分臨發空心服

麻花

錢三蜈蚣

各一條

水銀粉

錢一

婆娑石

錢二

青氣礬

錢二

明礬

錢二

雌黃

錢二

雄黃

錢半

血竭

錢一

右將青明雌火煨存性研細加血竭雄黃為末傳之

用唾調傳

治痔良方功如神

白礬

黃丹

焰硝

各等分

斑猫

不拘多少

右先用黃丹斑猫同炒焦取斑猫煎湯了去斑猫將已炒黃丹及白礬煖硝入在湯中洗而後薰冷時盛貯再煖薰而復洗須更加丹礬硝三件洗三次過五日其疾自乾浴此湯一次用時須加三件

烏玉丸 治內外翻花痔

大黃

一兩炮

厚朴

二錢半

枳殼

一兩

猪牙皂角

五錢

右為末搗芝麻丸桐子大每服三十丸用米湯下

治痔方

出本事方

信砒

一兩燒烟盡

穀精草

三錢

白礬

一錢

礪砂

三錢

右為末綿塊點藥撲上如痔乾可用水調傳

聖治方痔藥

白礬

血餘

石竹

各半兩

胡椒

二十粒

右用瓦礪盛泥固濟猛火煨通紅取出去泥用藥細研為末五更時用不語津調敷痔頭上不過三服效

治內痔大腸頭痛

仙茅

白朮

石南

各一兩

郁李仁

三錢

右為末每服一錢薄荷酒送下

治諸痔疾

出本
事方

塗杉

朴硝

大黃

側柏

各等
分

右以咀礮內煎二十沸於礮坐糞雞痔疾堪下手則洗之效

又方

出本
事方

枳殼

甘草

荊芥

香附子

炒去
毛

右等分為末每服二錢米泔湯調下

清涼散

一名當歸湯

治諸痔熱證大便閉結

方見本門痔漏類

薰洗方

出危氏

槐花

荊芥

枳殼

艾葉

各等分

右以咀煎白礬湯或明礬泡薰洗佳

神驗散

出聖濟總錄

治痔

當歸

焙一兩

白礬

二兩

桑蛾

二兩黃紫色者

木耳

二兩

右為散每服一錢匕粟米粥調下空心服

異功散

一名犀灰散出傳信適用方

治五痔腸風瀉血外痔及脫肛

下疳四邊努肉如乳皆治

黃牛腮角

碎一枝

蛇蛻皮

一條白者

猪牙皂角

五根

鯪魚甲

兩半

右入瓦瓶內黃泥封固候乾先以小火燒令烟出後用大火煨令通紅為度取出攤冷為散先用胡桃肉一枚分作四分取一分臨卧時研如粉溫酒送下便睡先引出蟲至五更時用溫服禦散二錢七分至辰時更一服雖患年深日久過三服瘡永除根

木瓜丸

出聖濟
總錄

治痔

木瓜

一兩成片曬乾為末
三分中留一分下藥

檳榔

三枚
為末

白礬

一兩
甜硝

分一

右用生麵旋起酵作一蒸餅糊相勻裹藥置火煮其上香熟乃去餅搗藥二百杵如藥乾即糊潤之為丸桐子大每服二十九丸空心木瓜香水湯下其藥內不見鐵犯火

木香散

出聖濟
總錄

貼痔

木香

栝榔

大者

黃連

各一分

莽草

半兩

兩

右為散每服五錢匕水二碗煎二三沸薰洗後用溫

水調以紙花子貼之

四妙散

出聖濟總錄

治蓮花痔及雞冠痔等貼

白芨

白歛

木鱉

桑螵蛸

各半兩

兩

右為散湯磨乳香調令稀稠得所攤故帛上貼次日

連皮折更無瘡痛效

四香湯

出聖濟總錄

治丈夫婦人久患痔不論有瘡無瘡

莎草根

一兩

黑狗脊

半兩

甘松草

黃熟香

上好極香者各一分

右搗篩每使五錢匕水一碗煎五七沸盛在深盆中
便令患者於上面坐圍衣被薰之勿透氣味下得手
便淋瀝患處直候藥冷即止不得揩拭便益覆卧一
時許若瀝了臨卧將被以火焙稍煖妙

槐子酒

出千金方

治五痔十年者

槐子

二斗

槐東南枝

細剉一石

槐東南根

細剉二石

右大釜中十六斛水煮五斛澄清更煎取一石六斗

炊二斛黍米上麴二十斤釀之攪令調封泥七日熟
取清飲適性常令小小醉合時更煮滓取汁淘米及
洗器不得用水湏知此事忌生水故也一方有槐柏
皮細剉一石

大豆帛方 治穀道痒痛繞腫起裏許欲生肉突出

方見

本門脉
痔類

換腸散

外痔
不用

草烏

生一
个

白薑

一指
大

白礬

一錢
飛

右為末乳香一錢研勻每用半錢葱涎調塗於肛門
內不久其痔自脫遂用落藥

三神丸

治僧痔道痔

僧覺海少年患痔其形業比永霜此緣飽食久坐知痔疾不必

酒色過度矣

枳殼

炒

白礬

皂角

燒存性

五倍子

等分

右為末蜜丸桐子大每服二三十丸溫水食前服

洗痔方

防風

當歸

川芎

各等分

右剉細煎水去滓候熟溫淋洗瘡用軟帛拭乾傳煎藥

治翻花痔久不瘥

地骨皮 乳香一兩 麝香五分炒末

右為末每服二錢米飲送下兼米飲傳瘡上

潔藥

馬蹄香 蒼朮 荊芥各二兩

右剉細以水三升煎數沸先噓後洗

薰法

出子金方

治五痔

蝟皮

方三指大切

雄黃

事大研

熟艾

雞子大

右為末用瓦器以灰入實一半如燒香法安長桶內坐其上薰之烟氣口出為佳凡一度永瘥勿犯風冷忌雞魚等物

貼藥

蜀葵子

半兩

蟬蛻

五個

楨榔

一個末

右棗子三枚取肉研細搜和藥如覺硬滴少蜜研成

膏量大小貼於病處

治痔蓮子散 呂子厚朴此累年用之立效

蓮子

十四个

草芽茶

十四个

乳香

隨意入

右搗了以紙裹煨透先以黃連湯洗患處然後以藥生貼之

三黃丸 治痔

黃連

黃栢

槐花

炒變色
各等分

右搗末麵糊為丸每服三十丸米飲下酒亦可

立效散 治風窠爛痔

苦參 卷栢 澤蘭葉

各一兩

右焙為末每服二錢無灰酒調下

治痔神方

黃葵

陰乾

風化朴硝

各等分

腦子

少許

右以蜒蚰置器中摻藥末於上令作水以桑葉貼之

立愈

治痔良方

白蓮花蕊 白牽牛頭末 芫荽子 各三錢

右入土硃少許為末空心熱酒調傳

乳香丸 治內外痔

枳殼 檳榔 各四兩 皂角子 四十灰炒熟

右為末用水糊丸桐子大每服二十丸用酒下米湯亦可食前服

寬腸丸

黃連 枳殼 百藥煎 各等分

右為末用水糊丸桐子大每服三十丸用米湯下
治諸痔痛

大蜈蚣

條

大青州棗

三個

白礬

一塊

如棗大

右蜈蚣白礬為末用棗肉丸分作二圓燒烟用竹筒
透引烟薰痔

治痔方

白礬

乳香

泥礬

少許

右為末用好醋二升熬成膏痔上貼

理痔方

五靈脂

四錢

膩粉

半兩

麝香

三十文

右為末先用甘草湯後用津唾調抹痔上痔濕作乾

撲

薰痔方

官桂

三分

蛇床子

五錢

蛇蛻

一條

右為末每服用一錢煎湯薰洗

收痔方

白欬

白芨

各一兩

黃丹

二兩

右為末輕粉麝香各少許麻油調敷立效

治痔疾腸風

半夏

湯炮洗七次

黃蓍

枳殼

右為末薑汁糊丸如菉豆大每服三十丸溫酒空心

下

椿皮丸

臭椿花

刮去粗皮焙乾四兩

蒼朮

枳殼

各一兩

右為末醋糊丸桐子大空心食前米飲下三四十丸
清心湯 諸痛痒瘡瘍皆屬於心心主血熱諸痔受病
之原

黃連

一兩 茯神

去木

赤茯苓

各五錢

右為末蜜丸桐子大每服一百丸食前米飲下止宜
食白米粥疏腸胃

能消丸 治五痔腫痛下血不止或榮衛滯澁身體疼
痛大便風閉不通

歲靈仙

十兩木香

右為末蜜丸桐子大每服五十丸荊芥湯下不拘時

勝金丸

雌黃

五錢

白礬

一兩

麝香

一錢

右研勻醞醋半盞銀器中慢火煎一半傾乳鉢內研
內勻再傾入器內熬成膏麝香少許研更入蒸餅心
少許和丸棗豆大每服夜卧溫漿水下十丸仍用一
丸手中心漿水調開塗痔三年者三五服瘥

應痛散 治痔

荊芥穗 桑根白皮 地榆各一

兩

右為散每三錢匕水一椀同殭橘二枚拍破煎三五沸傾入就薰瘡下的手方可洗仍服後藥

至聖丸

殭橘

一半去穰核剉

枳殼

半斤

黃連

去須五兩

右麩五升於銀石器內慢火炒令麩黑於地去火毒不用麩將藥為末用皂角一百枚去黃以水一升於

器內煮令熟爛如膏與前藥末同拌和丸桐子大每
服二十九丸溫米飲下不拘時日二服

普濟方卷二百九十五